

# การ แยกขี้ผึ้ง รังชันโรง

การเลือกชันโรงที่พร้อมจะแยก  
ขี้ผึ้งต้องเป็นรังชันโรงที่มีตัวเต็มวัย  
และตัวอ่อนพร้อมดักแด่ที่มีปริมาณ  
พอสมควรและมีอาหารถวขเกสร  
ถวขน้ำหวาน อีตาส่วนที่สมบูรณ์  
ปฏิบัติดังนี้



**1**



**ช่วงเวลาที่เหมาะสมควร**

การแยกขี้ผึ้งพันธุ์ชันโรง  
ควรดูช่วงเวลาที่มียาอาหารสมบูรณ์

ถวขน้ำหวาน

ถวขเกสร

กลุ่มไข่อ่อน

กลุ่มไข่อ่อน

**2**

**องค์ประกอบของรัง**


ตรวจสอบปริมาณ องค์ประกอบ  
ให้มีปริมาณสมดุลในขนาดใหญ่  
มากกว่า 2 กำมือ ก่อนทำการแยกรัง

**3**

**เปิดรังออก**

เปิดปากทางเข้าออกรัง ฝารัง และ  
พลาสติกใสออก เพื่อให้ชันโรง  
ภายในบินออก

**4**



**ย้ายรังเก่าออก**

นำรังเก่าออกห่างจากจุดเดิม  
ประมาณ 20-30 เมตร และนำรังชันโรง  
ที่ทำการแยกขี้ผึ้ง (รังใหม่) มาตั้งไว้  
ที่เดิม เพื่อให้ชันโรงกลับเขารัง

**ชุดปฏิบัติงาน**

ในการแยกขี้ผึ้ง ควร  
เป็นชุดที่ทำจากผ้าไหมและมีสีอ่อนๆ เช่น สีขาว เพราะ  
ชันโรงจะเสียดสีขนน้อยกว่า  
ผ้าสีเข้ม ถ้าเป็นสีเข้ม  
ชันโรงจะกัดและเกาะติด  
ผ้า และสาขในที่สุด และ  
ควรสวมหมวกตาข่าย ใส่  
ถุงมือ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

**วิธีการแยก**

การแยกกลุ่มไข่ ดักแด่ ตัวเต็มวัย  
ถวขเกสรและถวขน้ำหวาน  
ปริมาณครึ่งหนึ่งจากรังเดิม ไปใส่รัง  
ใหม่ โดยรังใหม่ต้องแห้งไม่ชื้น  
พร้อมทั้งนำขี้ชัน วางบริเวณทางเข้า  
เพื่อล่อตัวเต็มวัยชันโรงงานกลับเขารัง

**5**

**6**

**ศัตรูชันโรง**

การแยกรังเลี้ยงชันโรง ควรเตรียมวัสดุกัน  
ศัตรูชันโรง โดยเฉพาะ มดที่ชอบกินน้ำหวาน  
จะเข้าไปกัดกินหลอดดักแด่ของชันโรง  
ทำให้การแยกขี้ผึ้งเสียหาย  
ป้องกันโดยใช้น้ำมันเครื่องเก่าทาตามขา  
หรือหลักที่จะนำรังชันโรงไปตั้ง

**7**

